

お客様 各位



富山県富山市野々上 150 番地

TEL: 076-434-0036

FAX: 076-434-4968

除草剤「サーベル DF」の適用拡大のご案内

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、ご愛顧いただいております除草剤「サーベル DF」が、4月21日づけで下記の通り適用拡大されましたのでご案内申し上げます。適用拡大後のリーフレットは現在準備中でございます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

[変更内容の概要]

- ① 「適用病害虫の範囲及び使用方法」を以下のとおり変更する。
- ・ 作物名「日本芝」の使用時期に「春夏期 芝生育期 雑草発生始期～生育初期」を追加する。
 - ・ 作物名「日本芝」、「西洋芝 (ペレニアルライグラス)」、及び「西洋芝 (ケンタッキーブルーグラス)」について、使用方法「雑草茎葉散布」を「雑草茎葉散布又は全面散布」に変更する。

(変更前)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量 /10a	希釈水量 /10a	本剤の使用回数	使用方法	メスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
日本芝	—	1年生及び多年生広葉雑草	秋冬期 (雑草発生始期～生育初期)	2～4g	150～200L	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
西洋芝 (ペレニアルライグラス、ケンタッキーブルーグラス)		雑草発生始期	1～2g	200L				
樹木等		雑草生育初期	5～10g	100～150L				
	公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・運動場・宅地・鉄道・のり面 等	雑かん木	雑草生育期	10～20g	100～200L		植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	

(変更後)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量 /10a	希釈水量 /10a	本剤の使用回数	使用方法	メスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
日本芝	—	1年生及び多年生広葉雑草	春夏期 芝生育期 (雑草発生始期～生育初期)	1～2g	150～200L	2回以内	雑草茎葉散布 又は全面散布	2回以内
西洋芝 (ペレニアルライグラス、ケンタッキーブルーグラス)			雑草発生始期	2～4g				
			雑草発生始期	1～2g				
樹木等	公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・運動場・宅地・鉄道・のり面 等	雑かん木	雑草生育初期	5～10g	100～150L		植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	
		雑草生育期	10～20g	100～200L				

② 「使用上の注意事項」を以下のとおり追加・変更する。

【追加】

- ・ 芝に使用する場合は、雑草茎葉にかかるように散布すること。

【変更】

(変更前)

- ・ 本剤は遅効性で雑草が完全に枯れるまで 30～40 日程度かかるので、誤ってまき直しなどしないように注意すること。

(変更後)

- ・ 本剤は遅効性で雑草が完全に枯れるまで春夏期で 20～30 日、秋冬期で 30～40 日程度かかるので、誤ってまき直しなどしないように注意すること。

以上