



地面にはうましき雑草

地面にペタッと張り付いて広がっているコニシキソウ。葉が丸くてかわいらしい感じがしますが、これがなかなかしぶといのです。今回はコニシキソウについてご紹介します。

コニシキソウはトウダイグサ科の1年草です。春に発芽し、茎は根ぎわから数本に分かれ、地面に這うように伸びます。茎の途中から根をおろすことはありません。また、切ると白い汁が出ます。花期は7～9月で、丸い実をつけます。

茎が赤色をおび、葉の緑との対比の美しさから、ニシキソウ（錦とは美しい織物のこと）と呼ばれるようになったようです。

コニシキソウは長楕円形の葉の中央に暗赤色の斑紋があります。コニシキソウより葉がやや大きくまばらなニシキソウ（葉の斑紋はほとんどない）や、さらに葉が大きくて茎が立つオオニシキソウがあります。ちなみにニシキソウは在来種、コニシキソウとオオニシキソウは帰化植物です。コニシキソウの侵入後、ニシキソウは少なくなっているようです。

芝生内の雑草は、草丈があれば芝生を刈り取る際に一緒に刈り取られてしまうのですが、コニシキソウのように地面をはっているようなものは、刈り取りを免れてしまうので厄介です。

防除方法としては、春の発芽前には土壌処理剤、発生してしまった個体には茎葉処理剤を散布します。茎葉処理の場合は薬剤の効き目を最大にするために、なるべく発生初期に散布することがポイントです。



芝生内に繁茂したコニシキソウ



コニシキソウの花

帰化植物とは人為的（意識的または無意識的に）に移入した植物で、野生の状態で見出されるもの



秋になると紅葉する（紅葉初期）

製品紹介

サーベルDF

低薬量で安定した効果



- 有効成分：メトスルフロンメチル 60.0%
- 毒性：普通物
- 魚毒性：A類
- 原体メーカー：デュボン
- 包装：10g/袋、10袋入り/ケース

- 極めて低薬量で安定した効果を得られます。
- 雑草の茎葉部、根部から吸収され、細胞分裂を阻害します。
- 多年生広葉雑草には、秋冬期(10～2月)の処理が最も効果的です。
- クズへの使用では、晩秋(10～11月)の養分転流期の散布が効果的です。
- クズ防除には登録上の最大薬量(0.01g/m²)での使用をおすすめします。
- ▶芝の萌芽期～生育初期、および芝の生育が劣っている場合には、生育抑制などの薬害を生じることがあるため使用しないでください。
- ▶樹木、花きなどの茎葉にかからないよう、注意してください。
- ▶西洋芝に使用する場合は、温暖地・暖地や未完成ターフでは使用しないでください。
- ▶メトスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数は1回以内です。

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量/10a	希釈水量/10a
日本芝	1年生及び多年生 広葉雑草	秋期～冬期 (雑草発生始期～生育初期)	2～4g	150～200L
西洋芝(ペレニアルライグラス、 ケンタッキーブルーグラス)		秋期～冬期 (雑草発生始期)	1～2g	200L
樹木等		雑草生育初期	5～10g	100～150L

カーブSC

発生初期のスズメノカタビラにも効果あり



- 有効成分：プロピザミド 36.0%
- 毒性：普通物
- 魚毒性：A類
- 原体メーカー：ダウ
- 包装：1L/本、10本入り/ケース

- 土壌に処理層を形成し、幼芽・幼根での細胞分裂を阻害します。
- 発生初期のスズメノカタビラにも効果を発揮します。
- 長い残効性を持ち、秋期散布で120日以上効果が続きます。
- カーブ水和剤よりも有効成分の粒子が細かいため、分散性がよく、より安定した薬液が調合できます。(※これまで同様、よく攪拌してからご使用ください。)
- 液体なので計量がしやすく、取り扱いが容易です。

- ▶洋芝(特にベントグラス)に対して薬害を生ずるおそれがあるため、使用しないでください。
- ▶プロピザミドを含む農薬の総使用回数は2回以内です。

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量/10a	希釈水量/10a
日本芝	一年生雑草 (キク科を除く)	雑草発生前(芝生育期)	400～600ml	200～300L
	スズメノカタビラ	秋冬期雑草発生初期(芝生育期)		

バイザー水和剤

一年生雑草に長期間の効果



- 広範囲の一年生雑草に対し高い除草効果を示す土壌処理剤です。
- 残効性が極めて長く、春期処理で120日以上、秋期処理で180日以上抑草します。
- 日本芝・西洋芝どちらでも使用できます。
- 萌芽後の雑草には効果が劣ります。但しメヒシバには出芽直後にも活性を示します。
- ヤハズソウ、イヌタデ、オランダミミナグサ、オオイヌノフグリ、ナズナなどにも効果があります。

- 有効成分：ジチオピル 40.0%
- 毒性：普通物
- 魚毒性：B類
- 原体メーカー：ダウ
- 包装：500g/袋、4袋入り/ケース



- ▶ジチオピルを含む農薬の総使用回数は2回以内です。

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量/10a	希釈水量/10a
日本芝	一年生イネ科雑草	春期雑草発生前(芝生育期)	50～100g	200～300L
	一年生雑草	秋期雑草発生前(芝生育期)	100～200g	
西洋芝(ケンタッキー ブルーグラス)	一年生イネ科雑草	春期雑草発生前(芝生育期)	50～100g	
	一年生雑草	秋期雑草発生前(芝生育期)		
西洋芝(ライグラス)	一年生イネ科雑草	春期雑草発生前(芝生育期)		

取扱い・お問合せは—



緑を育み、未来へつなぐ

株式会社 サカエグリーン

〒930-0171 富山県富山市野々上150番地
TEL:076-434-0036 FAX:076-434-4968