

SAKAE GREEN NEWS

今月の特集： オランダミミナグサ

平成27年9月号

株式会社 サカイグリーン 富山市野々上150番地 ISO9001/14001取得 TEL (076)434-0036 FAX (076)434-4968

冬を越す雑草たち①

春になるとあちこちで見かける、小さな白い花をもつ雑草たち。ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、オランダミミナグサなどは、秋に発芽して冬を越し、翌春に花を咲かせます。発芽がはじまる秋に防除を行い、春に備えましょう。



オランダミミナグサ（ナデシコ科）は、ヨーロッパ原産の越年生広葉雑草（帰化植物）で、空き地や道ばた、田畑のまわり、庭など、様々な場所で見られます。漢字では「耳菜草」と書き、葉の形がネズミの耳に似ていることが由来のようです。英語でも、Sticky（ねばねばした）Mouse（ネズミの）-ear（耳）と呼ばれているそうです。

ちなみに、“オランダ”とついていますが、オランダ＝ヨーロッパの意ということで、特にオランダから来たというわけではないようです。



ハコベ



タネツケバナ

オランダミミナグサの仲間には、在来種であるミミナグサがあり、枕草子にも登場しています。オランダミミナグサは全体に毛が密生していますが、ミミナグサは毛が少なく、花も少なめです。また、近年では里山などの限られた場所でしか見られなくなっているようです。

オランダミミナグサは秋の終わりに発芽し、幼形で越冬して、春先から大きくなります。対策としては、[秋の発芽前に土壌処理剤を散布して発芽を抑え、翌春に発生した個体には、茎葉処理剤を散布する](#)と良いでしょう。

名前にちなんだものなのか、オランダミミナグサの花言葉は“聞き上手”なのだそう。話を聞いてほしい人に摘んでプレゼントしてみてもどうでしょうか？



オランダミミナグサ



葉がネズミの耳に似ている

製品紹介

ラポストフロアブル

芝にやさしくイネ科雑草に優れた効果を発揮



- イネ科雑草に優れた土壌処理効果があり、一般に春処理で100日程度の抑草が期待できます。
- 日本芝に対して、根部への影響が少なく、張り芝の活着・ランナーの発生を妨げません。また、周辺樹木に対し、ほとんど影響がありません。
- 土壌吸着性が強く、流亡の可能性が低い薬剤です。

- 有効成分：カフェンストロール 40.0%
- 毒性：普通物
- 魚毒性：B類
- 原体メーカー：SDSバイオテック
- 包装：500ml/本、12本入り/ケース

- 洋芝に対して薬害を生ずるおそれがあるため、使用しないでください。
- カフェンストロールを含む農薬の総使用回数は2回以内です。

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量/10a	希釈水量/10a
日本芝	1年生イネ科雑草	雑草発生前	250～500ml	200～300L

カーブSC

発生初期のスズメノカタビラにも効果あり



- 土壌に処理層を形成し、幼芽・幼根での細胞分裂を阻害します。
- 発生初期のスズメノカタビラにも効果を発揮します。
- 長い残効性を持ち、秋期散布で120日以上効果が続きます。
- カーブ水和剤よりも有効成分の粒子が細かいため、分散性がよく、より安定した薬液が調合できます。(※これまで同様、よく攪拌してからご使用ください。)
- 液体なので計量がしやすく、取り扱いが容易です。

- 有効成分：プロピザミド 36.0%
- 毒性：普通物
- 魚毒性：A類
- 原体メーカー：ダウ
- 包装：1L/本、10本入り/ケース

- 洋芝(特にベントグラス)に対して薬害を生ずるおそれがあるため、使用しないでください。
- プロピザミドを含む農薬の総使用回数は2回以内です。

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量/10a	希釈水量/10a
日本芝	一年生雑草 (キク科を除く)	雑草発生前(芝生育期)	400～600ml	200～300L
	スズメノカタビラ	秋冬期雑草発生初期(芝生育期)		

ターザインプロDF

土壌処理と茎葉処理の両効果でしっかり防除



- 一年生及び多年生広葉雑草、特にナデシコ科、キク科、マメ科雑草に高い効果を発揮します。
- 茎葉処理効果と土壌処理効果を併せ持つため、散布時期が広範囲です。
- 低温期に発生する雑草に高い効果があります。

- 有効成分：イネキサベン 60.0%
フロスラム 4.0%
- 毒性：普通物
- 魚毒性：A類
- 原体メーカー：ダウ
- 包装：100g/袋、20袋入り/ケース

- イネ科雑草に対しては効果がありません。また、生育の進んだ雑草には効果が劣ります。
- 使用の際は展着剤を可用して下さい。
- 遅効性のため、雑草が枯れるまで春夏期で2～3週間、秋冬期で4～6週間程度かかります。
- 付近の草花や花木、畑作物にかかったり、河川等に流入しないよう注意してください。
- イネキサベン及びフロスラムを含む農薬の総使用回数は2回以内です。

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量/10a	希釈水量/10a
日本芝 西洋芝 (ブルーグラス)	1年生及び多年性広葉雑草	芝生育期 (雑草発生初期)	30～50g	150～200L

取扱い・お問合せは—



緑を育み、未来へつなぐ

株式会社 サカイグリーン

〒930-0171 富山県富山市野々上150番地
TEL:076-434-0036 FAX:076-434-4968