

# SAKAE GREEN NEWS

今月の特集： ロボット芝刈機作動中！

2024年10月号

株式会社 サカエグリーン 富山市野々上150番地 ISO9001/14001取得 TEL(076)434-0036 FAX(076)434-4968

ぜひ現地で御覧ください！！

サカエグリーンでは、ハスクバーナ・ゼノア株式会社のロボット芝刈機オートモアシリーズを取り扱っています。今回は、会社敷地内とサッカーグラウンドで使用しているオートモアをご紹介します。

今年の3月より、サカエグリーンの敷地内で稼働し始めたのは、ホームシリーズの最新版、**オートモアAspireR4**（アスパイアアールフォー）。コンパクトな3輪タイプで、最大400㎡まで対応可能です。毎日9時から16時まで稼働しているので、ぜひ見に来てください！（ただし、9時～16時の間でも、充電がなくなった際はチャージステーションに戻って充電している場合があります）

サッカーグラウンドの現場では、**オートモア550**が6台稼働しています（写真右下）。こちらはサッカーグラウンド1面内で同時に3台を稼働しています。また、この現場ではチャージステーションで使用する電気は、敷地内にあるソーラーパネルによって賄っています。

今回ご紹介した、サカエグリーンで現在稼働しているオートモアは、地面に埋設したワイヤーを感知して動作していますが、今後はワイヤーを設置しなくても、GPSのによって施工範囲を認識する機体が登場してくる予定です。また、これまではランダムな軌道を描いて芝を刈っていましたが、最新型は規則的な動作が可能で、芝にきれいなストライプ模様をつけることができるそうです。

欧州の有名サッカーチームのグラウンドでは、最新機種がすでに稼働しているとか。ぜひ見てみたいものです。いずれ最新型を目にする機会があれば、その時はこちらでご紹介しますので楽しみに！！

平日9：00～16：00稼働中！



※充電のため停止する場合があります  
※機械に触らないでください



スマートフォンでらくらく操作！  
雨でも作業可能！  
動作音が静かで夜間施工も可能！  
高い安全性！お子様にも安心



ロボット芝刈機オートモアについてもっと詳しく知りたい方は▼



ハスクバーナ  
モバイルサイト



ソーラー施設



## 製品紹介

### バイオシュートEX

### バチルス菌の酵素でサッチを分解



- サッチ※の減少により、土壌処理型除草剤の効果の向上が期待できます。
- 土壌の透水性、通気性が高まります。
- 植物の発根を促進し、植物が本来持っている抵抗力を高めることで、病害の予防に繋がります。
- 日中の地温が10℃以上で使用してください。
- サッチが多い場合は、春と秋の2回散布が効果的です。

- 一般名称：微生物サッチ分解資材
- 内容成分：バチルス菌（生芽胞）  
5X10<sup>9</sup>cfu/g配合
- 包装：500g/袋、10袋入りケース
- 施用目安：0.2～0.4g/㎡  
(水量200～500ml/㎡)

**サッチ**とは枯れた芝や芝刈の際に発生した芝かすがたまって層になったもの。サッチが厚く集積すると、降雨をはじいて土壌への透水を妨げたり、逆に水を吸収して通気性を悪くしたりします。

### サーベルDF

### 低薬量で安定した効果



茎葉処理

- 極めて低薬量で安定した効果を得られます。
- 雑草の茎葉部、根部から吸収され、アミノ酸の生合成を阻害します。
- 多年生広葉雑草には、秋冬期（10～2月）の処理が最も効果的です。
- クズへの使用では、晩秋（10～11月）の養分転流期の散布が効果的です。
- クズ防除には登録上の最大薬量（0.01g/㎡）での使用をおすすめします。
- 芝の萌芽期～生育初期、および芝の生育が劣っている場合には、生育抑制などの薬害を生じることがあるため使用しないでください。
- 西洋芝に使用する場合は、温暖地・暖地や未完成ターフでは使用しないでください。
- メトスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数は1回以内です。

- 有効成分：メトスルフロンメチル
- 毒性：60.0%
- 包装：普通物  
10g/袋、10袋入り/ケース

| 作物名                              | 適用雑草名            | 使用時期                   | 薬量/10a | 希釈水量/10a |
|----------------------------------|------------------|------------------------|--------|----------|
| 日本芝                              | 1年生及び多年生<br>広葉雑草 | 秋期～冬期<br>(雑草発生始期～生育初期) | 2～4g   | 150～200L |
| 西洋芝（ペレニアルライグラス、<br>ケンタッキーブルーグラス） |                  | 秋期～冬期<br>(雑草発生始期)      | 1～2g   | 200L     |
| 樹木等                              |                  | 雑草生育初期                 | 5～10g  | 100～150L |

### カーブSC

### 発生初期のスズメノカタビラにも効果あり



- 土壌に処理層を形成し、幼芽・幼根での細胞分裂を阻害します。
- 発生初期のスズメノカタビラにも効果を発揮します。
- 長い残効性を持ち、秋期散布で120日以上効果が続きます。
- 洋芝（特にペントグラス）に対して薬害を生ずるおそれがあるため、使用しないでください。
- プロピザミドを含む農薬の総使用回数は2回以内です。

- 有効成分：プロピザミド 36.0%
- 毒性：普通物
- 包装：1L/本、10本入り/ケース

| 作物名 | 適用雑草名             | 使用時期            | 薬量/10a    | 希釈水量/10a |
|-----|-------------------|-----------------|-----------|----------|
| 日本芝 | 一年生雑草<br>(キク科を除く) | 雑草発生前（芝生育期）     | 400～600ml | 200～300L |
|     | スズメノカタビラ          | 秋冬期雑草発生初期（芝生育期） |           |          |

取扱い・お問合せはー

緑を育み、未来へつなぐ  
**株式会社 サカイグリーン**

〒930-0171 富山県富山市野々上150番地  
TEL:076-434-0036 FAX:076-434-4968