

あらゆる樹木の

気になる害虫に

効き目の一球。



ゴマダラカミキリ



殺虫剤

ダイアード[®]
粒剤

かえでにゴマダラカミキリが
追加されました

ゲンバウムシ



ツノロウムシ



アブラムシ



さかきの

サカキブチヒメヨコバイが

登録拡大されました

サカキブチヒメヨコバイと
その吸汁被害



ゴマダラカミキリ
ツノロウムシ
アブラムシ
ゲンバウムシ
サカキブチヒメヨコバイ

アセタミプリド粒剤 1.5kg入

®は日本曹達株式会社の登録商標です。



TAISHIN SANGYO CO.,LTD.
大信産業株式会社

ダイリーグ[®]

粒剤

アセタミプリド粒剤1.5kg入

有効成分：アセタミプリド 1.0%
 人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

特長

- 1 株元に散布するだけなので処理が簡単。
- 2 長期間効果が持続。
- 3 ミツバチや天敵に影響が少ない。
- 4 臭いが少ない。

散布時期目安

ゴマダラカミキリ	5月下旬～7月
カイガラムシ類	5月～7月
グンバイムシ類	5月～7月 および 9月～10月
サカキブチヒメヨコバイ	4月 および 9月
アブラムシ類	発生初期

背丈の高い樹木へは効果が劣る場合があります。

使用方法

樹木等の株元へそのまま散布する。



ダイリーグ粒剤の
 使い方はコチラから



殺虫成分は、根から樹体内へ吸収されます。

適用害虫の範囲および使用方法（抜粋）

本内容は2021年1月27日付の登録内容に基づいています。

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセタミプリドを含む農薬の総使用回数
つつじ類	グンバイムシ類	6～12kg/10a	発生初期	5回以内	株元散布	5回以内 (樹幹注入は1回以内)
	アブラムシ類	12～30kg/10a				
さかき	サカキブチヒメヨコバイ	30g/m ²				
しきみ	グンバイムシ類	12kg/10a				
	アブラムシ類	12～30kg/10a				
クロトン	カイガラムシ類	30kg/10a				
	ゴマダラカミキリ	30g/m ²				
かえで						
樹木類 (つつじ類、しきみ、クロトン、かえで、さかきを除く)	アブラムシ類	12～30kg/10a				
花き類・観葉植物		1g/株				

効果薬害等の注意

- (1) 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
- (2) 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にかからないようにしてください。
- (3) 花き類・観葉植物に使用する場合、幼苗期の使用では薬害を生じるおそれがあるので使用しないでください。
- (4) 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用の場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

使用上の注意

- (1) 本剤の中毒に対しては、動物実験でL-メチオニン製剤、グリチルリチン製剤及びグルタチオン製剤の注射投与が有効であるとする報告もあります。
- (2) 散布の際は農業用マスクなどを着用してください。作業後はうがいをしてください。
- (3) 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- (4) 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管

直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

包装：1.5kg×12袋入り

販売元



TAISHIN SANGYO CO., LTD.
大信産業株式会社

お求め・お問い合わせは

本社 〒722-8507 広島県尾道市美ノ郷町本郷1-180
 TEL.0848-38-2612 FAX.0848-38-2613
 緑化部 〒722-0212 広島県尾道市美ノ郷町本郷1-36
 TEL.0848-38-1193 FAX.0848-20-5211