

芝を守る殺菌剤

**ターフシキター**®

芝用殺菌剤

芝の赤焼病に!!



成分：プロパモカルブ塩酸塩・・・66.7% 水等・・・33.3% 性状：淡黄色澄明水溶性液体 人畜毒性：普通物 魚毒性：A類相当

## 主な特長

ピシウム菌による病害に即効的に高い効果を示します。

病原菌の感染・侵入の阻止（予防効果）のみならず、感染後すぐであれば、治療効果も示します。

根部からも吸収され、莖葉部に浸透移行して地上部でも効果を発揮します。

適度な土壌吸着があるので、流亡が比較的少ない薬剤です。


液剤ですので調製し易く、芝草に対する汚れもない液剤です。

## 適用病害と使用方法


作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロパモカルブ塩酸塩を含む農薬の総使用回数
芝（ベントグラス）	赤焼病	400～600倍	1ℓ/m <sup>2</sup>	発病初期	8回以内	散布	8回以内
		500倍	0.5ℓ/m <sup>2</sup>				

## 効果試験例

### 赤焼病に対する防除効果①



### 赤焼病に対する防除効果②



## ⚠ 効果・薬害等の注意

- うり科野菜、豆類、なすには薬害を生ずる恐れがあるので、周辺にそれらの作物がある場合にはかからないように注意すること。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## ⚠ 安全使用上の注意



- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

● 使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ● ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

アリスライフサイエンス株式会社

〒104-6591 東京都中央区明石町8-1  
TEL 03-3547-4416 FAX 03-3547-4695  
<http://www.agrofrontier.com>