

ありがとう
おかげさまで34周年

デュポン

ゾーバー® 水和剤

ゾーバー®は、米国デュポン社の登録商標です。

長期抑草タイプ除草剤

かんきつに適用拡大 となりました。

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 散布液量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ターバシルを含む農薬の総使用回数 | DCMUを含む農薬の総使用回数 |
|-------------|-----------------|------------------------------|----------|--|---------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| かんきつ | 畑地 一年生 雑草 | 雑草 発芽前 及び 雑草 生育期 | 300g/10a | 土壌処理 150L/10a 茎葉処理 200~300L/10a (非イオン系 展着剤加用) | 1回 | 土壌全面散布 及び 雑草の 茎葉散布 | 1回 | 1回 |
| りんご (成木) | | 200~ 300g/10a | | | | | | |

こんな方にオススメ!!

- 枯らしてもすぐに雑草が発生して困っている方。
- 栽培面積が広く雑草管理が大変な方。
- 接触剤を散布しても草が多く残っている方。



散布前




散布75日後

ゾーバーの上手な使い方

ゾーバーは、「春草が生える前」・「生えている時期」の両方に高い効果があります。従って、散布の際は、1.まきむらのないように、2.たっぷりの水で、3.土にも草にもまんべんなく……これがポイントです。

- *なるべく春草の幼少期（10月～2月）の使用をおすすめします。
- *3月以降など草丈が大きくなった場合は、接触型除草剤との混用が効果的です。
- *年1回使用

たっぷりの水で、土にも草にもたっぷり！



中晩柑類での安全性

ゾーバーの高い安全性は、柑きつの品種を問いません。温州みかんや甘夏柑をはじめ、あらゆる柑きつに安心してお使いになれます。また、毎年同じ園に続けて散布しても問題はありません。

37品種の柑きつに対し、10年間にわたり毎年ゾーバーを散布する試験が行われました。その結果、全品種共異常のないことが確認されています。

晩柑類（37品種系統）におけるゾーバーの連年使用

（香川県農業試験場 府中分）

1. 散布条件
 - イ) 散布薬剤及び散布方法
 - ゾーバー：300g/10a ●水量：300ℓ/10a ●全面散布
 - ロ) 散布時期及び試験年次
 - 4～5月に毎年1回 S.47～S.56年（10年間継続）
 - ハ) 土壌の種類
 - 安山岩、埴壤土（レキに富む）

2. 散布対象品種系統

| 番号 | 品種系統名 | 樹令 | 番号 | 品種系統名 | 樹令 |
|----|-----------|----|----|-----------|----|
| 1 | 新甘夏 | 3 | 20 | 森田ネーブル | 2 |
| 2 | 宮内伊予柑 | 3 | 21 | 大三島ネーブル | 2 |
| 3 | 白柳ネーブル | 3 | 22 | ミネオラ | 2 |
| 4 | バレンシアオレンジ | 8 | 23 | 清見 | 2 |
| 5 | 四季橘 | 8 | 24 | スイートスプリング | 2 |
| 6 | タチバナ | 8 | 25 | 2371 | 2 |
| 7 | 菊ミカン | 8 | 26 | 5770 | 2 |
| 8 | グレープフルーツ | 8 | 27 | カラマンダリン | 1 |
| 9 | スダチ | 8 | 28 | 清家ネーブル | 1 |
| 10 | 座ダイダイ | 5 | 29 | 高しょうポンカン | 1 |
| 11 | ソ連タンゼロ | 8 | 30 | 花柚 | 2 |
| 12 | ヤラハ | 7 | 31 | 春の煙 | 2 |
| 13 | 鈴木ネーブル | 2 | 32 | 回貫柑 | 2 |
| 14 | セミノール | 3 | 33 | キンズ | 2 |
| 15 | サンジャシントウ | 2 | 34 | マートルリーフ | 2 |
| 16 | 福ーネーブル | 2 | 35 | ダイダイ | 2 |
| 17 | ウマテーラ | 2 | 36 | 四季成レモン | 2 |
| 18 | 吉田ネーブル | 3 | 37 | 大実キンカン | 2 |
| 19 | 吉田ネーブルA | 2 | | | |

（樹令はS.48年現年）

3. 観察
 - 全品種、系統共56年現在に於いて健全で薬害はみられない。



温州はもちろん、あらゆる品種に使えます。温州

（その他、セミノール、キンカンなど）

- 【使用上の注意】
- 砂質で透水性の大きい園では薬害の恐れがあるので使用しないでください。
 - 夏みかん、りんごに対しては成木のみを対象としてください。
 - 松、杉、榎などの防風垣の近くでは使用しないでください。
 - 本剤を散布した園で他の作物を間作しないでください。
 - 作物の葉、付近の農作物、芝生、花卉類などに薬液をかけないでください。また近くに根の浅い作物がある場合は散布液が流出しないように注意してください。

空袋は圃場などに放置せず、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。 包装：100g×60、300g×30

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

販売
デュポン ファーム ソリューション株式会社
本社分室：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 ☎03-5296-2327
札幌/☎011-222-2336 仙台/☎022-217-0222 名古屋/☎052-951-7231
大阪/☎06-6371-2261 福岡/☎092-714-6470

輸入元
デュポン株式会社

お求めは・・・